


 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU Jl.Ronggolawe 50 Telp.(0296) 421026 Fax:424373 E-mail:rs.soeprapto.cepu@gmail.com C E P U – 58311</p>	MEMASUKKAN SUPPOSITORIA REKTAL		
	No. Dokumen 112/SPO.Ply/VIII/2024	No. Revisi 1	Halaman 1 dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit 1 Agustus 2024	Ditetapkan oleh, Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora  drg. WILYS YUNIARTI, MM Pembina Tk. NIP. 197906 25200501 2 016	
PENGERTIAN	Memasukkan obat dalam bentuk suppositoria melalui rectal, melewati sifniter ani interna		
TUJUAN	Untuk memberikan obat pasien yang tidak dapat dilakukan per oral		
KEBIJAKAN	Mempercepat kesembuhan pasien		
PROSEDUR	Persiapan alat : 1. Formulir obat 2. Suppositoria rectal 3. Jelly pelumas 4. Sarung tangan bersih sekali pakai 5. Tisu 6. Bengkok		
	Tahap pra interaksi : 1. Verifikasi program terapi 2. Siapkan alat 3. Jaga privacy klien ; bila perlu tutup pintu dan jendela / korden		
	Tahap orientasi : 1. Berikan salam . 2. Jelaskan tujuan dan prosedur 3. Beri kesempatan klien untuk bertanya 4. Tanyakan persetujuan dan kesiapan klien 5. Persiapan alat didekatkan klien		
	Tahap kerja : 1. Cuci tangan dan kenakan sarung tangan 2. Jelaskan prosedur pada klien 3. Minta klien untuk melakukan posisi miring (sim) dengan tungkai bagian atas fleksis ke depan 4. Jaga agar klien tetap terselimuti dan hanya areal anal yang terpajang 5. Buka suppositoria dari kemasannya dan beri pelumas pada ujung bulatnya dengan jelly. Beri pelumas pada jari telunjuk dari tangan dominan yang memakai		

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU Jl.Ronggolawe 50 Telp.(0296) 421026 Fax:424373 E-mail:rs.soeprapto.cepu@gmail.com C E P U – 58311</p>	MEMASUKKAN SUPPOSITORIA REKTAL		
	No. Dokumen 112/SPO.Ply/VIII/2024	No. Revisi 1	Halaman 2 dari 2
<p>sarung tangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Minta klien untuk menarik nafas perlahan melalui mulut dan untuk merilekskan sfingter ani 7. Renggangkan bokong klien dengan tangan non-dominan anda. Dengan jari telunjuk masukkan suppsitoria dengan perlahan melalui anus, melalui sfingter anus dan mengenai dinding rectal : 10 cm pada orang dewasa, 5 cm untuk anak-anak bayi 8. Tarik jari anda dan bersihkan areal anak klien 9. Instruksikan klien untuk tetap berbaring terlentang atau miring selama 5 menit 10. Bila suppositoria mengandung laksan, beri tahu klien / keluarga sehingga ia dapat mencari bantuan untuk mengambil pispot atau ke kamar mandi 11. lepas sarung tangan dengan membalik bagian dalam keluar dan buang ke tempat yang telah di sediakan <p>Tahap terminasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ucapkan terima kasih atas kerjasama dengan pasien 2. Evaluasi respon klien 3. Kontrak waktu kegiatan selanjutnya 4. Atur posisi klien senyaman mungkin 5. Bereskan alat-alat dan kembalikan pada tempatnya 6. Mencuci tangan 7. Mendokumentasikan pada catatan perawatan 			
<p>UNIT TERKAIT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rawat Inap 2. Rawat Jalan 3. UGD 4. Kamar Operasi 			