



PEMERINTAH
KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50
Telp. (0296) 421026 Fax: 424373
Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
CEPU - 58311

**PEMBERIAN ERYTHROPOIETIN MELALUI
INTRAVENA BLOOD LINE**

No. Dokumen :
62/SPO.HD/VI/24


No. Revisi :
0

Halaman :
1 dari 1

**STANDAR PROSEDUR
OPERASIONAL**

Tanggal terbit

Ditetapkan,
Direktur
RSUD dr. R. Soeprapto Cepu


drg. WILYS YUNIARTI, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19790625 200501 2 016

Pengertian

Pemberian obat erythropoietin melalui Vena Bloodline (VBL) pada khir dialysis untuk memenuhi target Hb pasien dengan terapi erythropoietin

Tujuan

Target Hb terpenuhi yaitu > 10 gr/dl

Kebijakan

Surat Keputusan Direktur Nomor : 800/39/II/2024 tentang Pedoman Pelayanan Unit Dialisis RSUD dr. R. Soeprapto Cepu

Prosedur

1. Obat erythropoietin dikeluarkan dari almari es 15 s.d 30 menit sebelum diberikan agar erythropoietin mencapai suhu kamar secara perlahan
2. Lima menit sebelum dialysis berakhir kurangi QB s.d 100-150rpm untuk menghindari resirkulasi
3. Disinfeksi port vena bloodline dengan kapas alcohol. Pasien diberitahu.
4. Letakkan dua jari pada kedua sisi port vena karet untuk mencegah tertusuknya jarum secara tidak sengaja
5. Jarum erythropoietin diarahkan pada tengah-tengah port vena untuk membantu penetrasi dengan memperhatikan bahwa jarum tegak lurus
6. Erythropoietin diinjeksikan sampai habis dari syringe. Syringe tetap ditekan kuat saat dicabut untuk menghindari terhisapnya Kembali erythropoietin dan darah ke dalam syringe.
7. Pasien diberitahu bahwa obat sudah dimasukkan
8. Hal yang harus diperhatikan yaitu TD systole <180 mmHg dan systole <100 mmHg, atau dengan persetujuan dokter.

Unit Terkait

-